

## BIJWERKINGEN & COMPLICATIES

De oogleden sluiten minder goed in de eerste weken na de ingreep waardoor er tijdelijk droge ogen kunnen ontstaan. Hiervoor worden kunststranen voorgeschreven indien nodig.

Lokale zwelling en bloeduitstorting trekken geleidelijk weg en zijn gemiddeld na 2 weken verdwenen. Het gebeurt soms dat een bloeduitstorting en vochtophoping uitzakken naar de onderoogleden in de eerste week na de ingreep.

Bij de operatie wordt het litteken in de huidplooi van het bovenooglid geplaatst zodat het zo weinig mogelijk zichtbaar is. Roken heeft een negatieve invloed op het genezen van littekens.

Er kan tijdelijk een verminderde gevoeligheid van de huid optreden na de ingreep. Deze gevoeligheid keert terug in de eerste 3 maanden na de operatie.

## HUIDTEVEEL — OOGLEIDCORRECTIE



## WANNEER CONTACT OPNEMEN?

### CONTACT

In de eerste dagen na de operatie bestaat er een klein risico op een nabloeding. Een zeer zeldzame complicatie is een nabloeding in de oogkas; hierdoor ontwikkelt men dubbel zien en visusdaling.

U kan steeds contact met ons opnemen indien u twijfelt.

In geval van urgentie of bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren:

**015/683 319**

maandag t.e.m. vrijdag 8u - 20u  
en zaterdagvoormiddag 9u - 12u

**03/491 23 44**

spoed van het Heilig Hart ziekenhuis  
in Lier na 20u en in het weekend

**info@oogcentrumvisie.be**

Via deze folder willen wij u informeren omtrent het verloop van een ooglidcorrectie. Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek dat u met ons heeft gehad.

## DIAGNOSE

Een huidteveel in de boven- of onderoogleden wordt **DERMATOCHALASIS** genoemd. Het bindweefsel verliest zijn elasticiteit, waardoor de huid steeds meer gaat "overhangen". De huid wordt dunner en gevoelig voor vocht-ophoping.

Hangende oogleden veroorzaken een beperking van het gezichtsveld, waardoor hoofdpijn en vermoeide ogen ontstaan. Een ooglidcorrectie kan een oplossing bieden voor deze problemen.

## LAAGSTAND VAN HET BOVENOGLID OF DE WENKBRAUW

Een huidteveel van de bovenoogleden kan gepaard gaan met een laagstand van het bovenooglid en/of een laagstand van de wenkbrauw. Deze afwijkingen worden op een andere manier chirurgisch gecorrigeerd. Soms is het nodig dit gelijktijdig of voorafgaand te behandelen, omdat een operatie van het huidteveel alleen niet het gewenste resultaat oplevert.

## BEHANDELING

Een ooglidcorrectie oftewel **BLEFAROPLASTIE** is de operatie waarbij het huidteveel wordt verwijderd.

## KOSTPRIJS

De bovenooglidcorrectie wordt in **specifieke gevallen** terugbetaald. Afhankelijk van enkele (technische) onderzoeken zal uw ingreep wel of niet gedeeltelijk bekostigd worden door de mutualiteit.

Een **bovenooglidcorrectie** start vanaf **750 euro**. Een **onderooglidcorrectie** wordt **niet terugbetaald**, de prijs bedraagt **1250 euro**.

## WERKWIJZE

De operatie van de bovenoogleden vindt plaats onder lokale verdoving; men hoeft niet nuchter te zijn. Een half uur voor de ingreep wordt een kalmerend tabletje toegediend. Na de operatie wordt er lokaal gekoeld gedurende een half uur. Er wordt geen verband aangebracht. Nadien kan men naar huis. De dag van de ingreep kan men niet met de wagen rijden. Een correctie van de onderoogleden gebeurt onder algemene narcose.

## NAZORG

Voor de nazorg in de eerste week na de ingreep krijgt men het volgende mee:

Een **ijsmasker**

voor lokale koeling in de eerste dagen

•

**Oogzalf** (Tobrex)

voor aan te brengen na de ingreep

•

**Dafalgan-codeïne**

bij eventuele pijn na de ingreep mag men deze gebruiken.

*Aspirine / Ibuprofen / Neurofen worden best vermeden*

Voorzichtigheid met **heffen, bukken, persen en tillen** in de eerste dagen na de ingreep is aangeraden. Dit om geen nabloeding uit te lokken.

Men mag in de week na de ingreep douchen, probeer het wondgebied **zo droog mogelijk** te houden.

De hechtingen worden **vijf tot zeven dagen na de ingreep** verwijderd.

Na **twee weken** mag men alle (sportieve) activiteiten hervatten.

De huid is in de eerste maanden na de ingreep gevoelig voor zonlicht, men kan daarom best een zonnebril of zonnecrème **factor 50** gebruiken bij zonblootstelling.

VOOR



NA

